

●ヨード造影剤併用禁忌薬剤、併用注意薬剤一覧

2024/11 改訂

ヨード造影剤を使用する検査（造影CT、血管造影、心カテ、DIP、DIC等）を行う場合には、ビグアノイド系糖尿病用剤・NSAID s の服用を確認してください。

* 併用禁忌薬剤（ビグアノイド系糖尿病用剤）では、**造影剤使用前後2日間（当日含め計5日間）**使用を一時的に中止する必要があります。

* 併用注意薬剤（NSAID s）では、臨床上可能なら**造影剤使用前後1日間（当日含め計3日間）**使用を一時的に中止する必要があります。

下の写真の“糖尿病薬”を飲まれている方は
造影CT検査や尿路造影検査を受ける前に
放射線科スタッフにお知らせください

メトホルミン塩酸塩錠 250mg MT 「三和」「トーワ」「日医工」「ニプロ」「明治」「DSEP」「DSPB」「JG」「TCK」「TE」「VTRS」



メトホルミン塩酸塩錠 500mg MT 「三和」「トーワ」「日医工」「ニプロ」「明治」「DSEP」「DSPB」「JG」「TCK」「TE」「VTRS」



●ヨード造影剤併用禁忌薬剤、併用注意薬剤一覧

2024/11 改訂

ヨード造影剤を使用する検査（造影CT、血管造影、心カテ、DIP、DIC等）を行う場合には、ビグアナイド系糖尿病用剤・NSAID s の服用を確認してください。

* 併用禁忌薬剤（ビグアナイド系糖尿病用剤）では、**造影剤使用前後2日間（当日含め計5日間）**使用を一時的に中止する必要があります。

* 併用注意薬剤（NSAID s）では、臨床上可能なら**造影剤使用前後1日間（当日含め計3日間）**使用を一時的に中止する必要があります。

下の写真の“糖尿病薬”を飲まれている方は
造影CT検査や尿路造影検査を受ける前に
放射線科スタッフにお知らせください

