

【レジメン】

消化器科【胃癌】『CAPOX療法』

カペシタビン(Capecitabin)【day 1~14】+ オキサリプラチン(L-OHP)【day 1】

対象症例 治癒切除不能な進行・再発の胃癌

1クール 3週間

薬剤	投与量	day1	day15	day22
カペシタビン(ゼローダ)	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬	
オキサリプラチン(L-OHP)	100 mg/m ²	↑		↑

【カペシタビン投与表】 1日2回朝・夕食後30分以内

体表面積	1日投与量 (mg)	1日投与量 (錠)
1.36m ² 未満	2,400 mg	8錠
1.36m ² 以上 1.66m ² 未満	3,000 mg	10錠
1.66m ² 以上 1.96m ² 未満	3,600 mg	12錠
1.96m ² 以上	4,200 mg	14錠

【レジメン】

消化器科【胃癌】『CDDP+CPT-11療法』

シスプラチン(CDDP)【day 1】 + イリノテカン(CPT-11)【day1, 15】

対象症例	PS 0~2 で主要臓器機能に大きな異常がない。 水様下痢がない。臨床上腸管狭窄がない。 24時間CCrが50ml/min以上。高度の黄疸がない。 a) 切除不能胃癌のSecond line b) 転移再発胃癌のSecond line c) 5-FU系抗癌剤治療抵抗症例					
1クール	28日					
薬剤	投与量	day1	day8	day15	day22	day29
シスプラチン(CDDP)	80mg/m ²	↑				↑
イリノテカン(CPT-11)	70mg/m ²	↑		↑		↑

【レジメン】

消化器科【胃癌】『CPT-11単独療法』

イリノテカン(CPT-11)【day1, 8, 15】

対象症例	胃癌				
1クール	35～42日				
	薬剤	投与量	day1	day8	day15
	イリノテカン(CPT-11)	100mg/m ²	↑	↑	↑

消化器科【胃癌】『HER+CAPOX療法』

カペシタビン【day 1~14】+ オキサリプラチン(L-OHP)【day 1】+ トラスツズマブ(HER)【day1】

対象症例	HER2陽性切除不能な進行・再発胃癌 ※CDDPが使用できない場合			
1クール	3週間			
薬剤	投与量	day1	day15	day22
カペシタビン(ゼローダ)	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬	
オキサリプラチン(L-OHP)	100 mg/m ²	↑		↑
トラスツズマブ(HER)	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	↑		↑

【カペシタビン投与表】	1日2回朝・夕食後30分以内	
体表面積	1日投与量 (mg)	1日投与量 (錠)
1.36m ² 未満	2,400 mg	8錠
1.36m ² 以上 1.66m ² 未満	3,000 mg	10錠
1.66m ² 以上 1.96m ² 未満	3,600 mg	12錠
1.96m ² 以上	4,200 mg	14錠

消化器科【胃癌】『HER+SOX療法』

TS-1(S-1)【day 1～day 14】+ オキサリプラチン(L-OHP)【day 1】+ トラスツズマブ(HER)【day1】

対象症例	HER2陽性切除不能な進行・再発胃癌 ※CDDPが使用できない場合				
1クール	3週間				
薬剤	投与量	day1	day15	day22	
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与		7日間休薬	
オキサリプラチン(L-OHP)	100 mg/m ²	↑		↑	
トラスツズマブ(HER)	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	↑		↑	

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m ² 未満	80 mg
1.25m ² 以上 1.5m ² 未満	100 mg
1.5m ² 以上	120 mg

【レジメン】

消化器科【胃癌】『HER+SP療法』

TS-1(S-1)【day 1～day 14】 + シスプラチン(CDDP)【day 1】 + トラスツズマブ(HER)【day 1】

対象症例 HER2陽性切除不能な進行・再発胃癌
※カペシタピンが使用できない場合

1クール 21日

薬剤	投与量	day1	day22
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬
シスプラチン(CDDP)	60mg/m ²	↑	↑
トラスツズマブ(HER)	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	↑	↑

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m ² 未満	80 mg
1.25m ² 以上 1.5m ² 未満	100 mg
1.5m ² 以上	120 mg

【レジメン】

消化器科【胃癌】『HER+XP療法』

カペシタビン(Capecitabine)【day 1～day 14】+ シスプラチン(CDDP)【day1】+ トラスツズマブ(HER)【day1】

対象症例 PS 0～2 で主要臓器機能に大きな異常がない。24時間CCrが ≥ 50 ml/min以上
 a) HER2陽性切除不能胃癌のFirst line もしくは Second line
 b) HER2陽性転移再発胃癌のFirst line もしくは Second line

1クール 21日


薬剤	投与量	day1	day15	day22
カペシタビン(ゼローダ)	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬	
シスプラチン(CDDP)	80mg/m ²	↑		↑
トラスツズマブ(HER)	初回 8mg/kg 2回目以降 6mg/kg	↑		↑

【カペシタビン投与表】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量 (mg)	1日投与量 (錠)
1.36m ² 未満	2,400 mg	8 錠
1.36m ² 以上 1.66m ² 未満	3,000 mg	10 錠
1.66m ² 以上 1.96m ² 未満	3,600 mg	12 錠
1.96m ² 以上	4,200 mg	14 錠

消化器科【胃癌】『mFOLFOX6療法』

オキサリプラチン(L-OHP) + レボホリナート(I-LV) + 5-FU



【レジメン】

消化器科【胃癌】『アブラキサン(nab-PTX) 単独療法(3週毎投与法)』

アブラキサン (nab-PTX) 【day1】

対象症例	胃癌		
1クール	21日		
薬剤	投与量	day1	day22
アブラキサン(nab-PTX)	260mg/m ²	↑	↑

【レジメン】

消化器科【胃癌】『アブラキサン(nab-PTX) 単独療法(毎週投与方法)』

アブラキサン (nab-PTX) 【day1, 8, 15】

対象症例	胃癌				
1クール	28日				
薬剤	投与量	day1	day8	day15	day22
アブラキサン(nab-PTX)	100mg/m ²	↑	↑	↑	

【レジメン】

消化器科【胃癌】『Paclitaxel (PTX) 療法』

パクリタキセル(PTX)【day1, 8, 15】

対象症例	PS 0~2 で主要臓器機能に大きな異常がない。						
	a) 切除不能胃癌のSecond line						
	b) 転移再発胃癌のSecond line						
	c) 5-FU系抗癌剤治療抵抗症例						
	d) 腹膜播種症例						
1クール	28日						
	薬剤	投与量	day1	day8	day15	day22	day29
	パクリタキセル(PTX)	80mg/m ²	↑	↑	↑		↑

【レジメン】

消化器科【胃癌】『Ramucirumab療法』

ラムシルマブ【day1】

対象症例	治癒切除不能な進行・再発胃癌のsecond line		
1クール	2週間		
薬剤	投与量	day1	day15
ラムシルマブ(サイラムザ)	8mg/kg	↑	↑

【 レジメン 】

消化器科【 胃癌 】『 Ramucirumab + nab-paclitaxel併用療法 』

ラムシルマブ【 day1, 15】 + アブラキサン (nab-PTX)【 day1, 8, 15】

対象症例	治癒切除不能な進行・再発胃癌のsecond line				
1クール	28日				
薬剤	投与量	day1	day8	day15	day29
ラムシルマブ(サイラムザ)	8mg/kg	↑		↑	↑
アブラキサン (nab-PTX)	100mg/m ²	↑	↑	↑	↑

【レジメン】

消化器科【胃癌】『Ramucirumab+Paclitaxel併用療法』

ラムシルマブ【day1, 15】+パクリタキセル(PTX)【day1, 8, 15】

対象症例	治癒切除不能な進行・再発胃癌のsecond line						
1クール	28日						
薬剤	投与量	day1	day8	day15	day29		
ラムシルマブ(サイラムザ)	8mg/kg	↑		↑	↑		
パクリタキセル(PTX)	80mg/m ²	↑	↑	↑	↑		

【レジメン】

消化器科【胃癌】『S-1+CDDP療法』

TS-1(S-1)【day 1～day 21】 + シスプラチン(CDDP)【day 8】

対象症例

PS 0～2 で主要臓器機能に大きな異常がない。24時間CCrが50mL/min以上
 a) 切除不能胃癌のFirst line もしくは Second line
 b) 転移再発胃癌のFirst line もしくは Second line
 c) 術前補助化学療法のFirst line

1クール

35日

薬剤	投与量	day1	day8	day22	day36
TS-1	体表面積に応じて投与	21日間連日経口投与		14日間休薬	
シスプラチン(CDDP)	60mg/m ²		↑		

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m ² 未満	80 mg
1.25m ² 以上 1.5m ² 未満	100 mg
1.5m ² 以上	120 mg

【レジメン】

消化器科【胃癌】『S-1+Docetaxel(DTX)療法(術後補助療法)』

TS-1(S-1)【day1～day14】 + ドセタキセル(DTX)【day1】

対象症例 StageⅢの治癒切除胃癌の術後補助化学療法

1クール 21日/42日

【1コース】

薬剤	投与量	day1	day15
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬

【2～7コース】

薬剤	投与量	day1	day15
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬
ドセタキセル(DTX)	40mg/m ²	↑	

【8～11or12コース】 TS-1+DTX併用終了後、手術1年後まで

薬剤	投与量	day1	day29
TS-1	体表面積に応じて投与	28日間連日経口投与	14日間休薬

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m ² 未満	80 mg
1.25m ² 以上 1.5m ² 未満	100 mg
1.5m ² 以上	120 mg

【レジメン】

消化器科【胃癌】『S-1+Docetaxel(DTX)療法(切除不能胃癌)』

TS-1(S-1)【day1～day14】 + ドセタキセル(DTX)【day1】

対象症例 切除不能胃癌のFirst line もしくは Second line

1クール 21日

薬剤	投与量	day1	day15
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬
ドセタキセル(DTX)	40mg/m ²	↑	

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m ² 未満	80 mg
1.25m ² 以上 1.5m ² 未満	100 mg
1.5m ² 以上	120 mg

【レジメン】

消化器科【胃癌】『S-1+Docetaxel(DTX)療法』

TS-1(S-1)【day1～day14】 + ドセタキセル(DTX)【day1】

対象症例 a) 切除不能胃癌のFirst line もしくは Second line
b) StageⅢの治癒切除胃癌の術後補助化学療法

1クール 21日

薬剤	投与量	day1	day15	day22
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与		
ドセタキセル(DTX)	40mg/m ²	↑	7日間休薬	↑

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m ² 未満	80 mg
1.25m ² 以上 1.5m ² 未満	100 mg
1.5m ² 以上	120 mg

【レジメン】

消化器科【胃癌】『S-1+DTX+CDDP療法』

TS-1(S-1)【day 1～day 14】 + ドセタキセル(DTX)【day 8】 + シスプラチン(CDDP)【day 8】

対象症例

PS 0～2 で主要臓器機能に大きな異常がない。
 投与開始日より3ヶ月以上の生存が期待できる。
 a) 切除不能胃癌のFirst line
 ただし、grade3以上の好中球減少や食思不振、嘔気が出現する頻度が高く、十分に症例を検討し、informed consentを得ること。

1クール 21日

薬剤	投与量	day1	day8	day15	day22
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与		7日間休薬	
ドセタキセル(DTX)	60mg/m ²		↑		
シスプラチン(CDDP)	60mg/m ²		↑		

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m ² 未満	80 mg
1.25m ² 以上 1.5m ² 未満	100 mg
1.5m ² 以上	120 mg

【 レジメン 】

消化器科【 胃癌 】『 SOX 療法 』

TS-1(S-1)【day 1～day 14】 + オキサリプラチン(L-OHP)【day 1】

対象症例 治癒切除不能な進行・再発の胃癌

1クール 21日

薬剤	投与量	day1	day15	day22
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与	7日間休薬	
オキサリプラチン(L-OHP)	100mg/m ²	↑		↑

【 TS-1投与表(1日量) 】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m ² 未満	80 mg
1.25m ² 以上 1.5m ² 未満	100 mg
1.5m ² 以上	120 mg

消化器科【胃癌】『XP療法』

カペシタビン(Capecitabine)【day 1～day 14】 + シスプラチン(CDDP)【day 1】

対象症例 PS 0～2 で主要臓器機能に大きな異常がない。24時間CCrが50mL/min以上
 a) 切除不能胃癌のFirst line もしくは Second line
 b) 転移再発胃癌のFirst line もしくは Second line

1クール 21日



【カペシタビン投与表】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量 (mg)	1日投与量 (錠)
1.36m ² 未満	2,400 mg	8 錠
1.36m ² 以上 1.66m ² 未満	3,000 mg	10 錠
1.66m ² 以上 1.96m ² 未満	3,600 mg	12 錠
1.96m ² 以上	4,200 mg	14 錠


【レジメン】

消化器科【胃癌】『ニボルマブ+CAPOX療法』

ニボルマブ(オプジーボ)【day 1】+カペシタピン(Capecitabin)【day 1~14】+オキサリプラチン(L-OHP)【day 1】

対象症例 HER2陰性である治癒切除不能な進行・再発の胃癌

1クール 21日



【カペシタピン投与表】


1日2回朝・夕食後30分以内

体表面積	1日投与量 (mg)	1日投与量 (錠)
1.36m ² 未満	2,400 mg	8錠
1.36m ² 以上 1.66m ² 未満	3,000 mg	10錠
1.66m ² 以上 1.96m ² 未満	3,600 mg	12錠
1.96m ² 以上	4,200 mg	14錠

【レジメン】

消化器科【胃癌】『ニボルマブ + mFOLFOX6 療法』

ニボルマブ(オプジーボ) + オキサリプラチン(L-OHP) + レボホリナート(I-LV) + 5-FU



【レジメン】

消化器科【胃癌】『ニボルマブ+SOX療法』

ニボルマブ(オプジーボ)【day1】+TS-1(S-1)【day1~day14】 + オキサリプラチン(L-OHP)【day1】

対象症例 HER2陰性である治癒切除不能な進行・再発の胃癌

1クール 21日

薬剤	投与量	day1	day15	day22
ニボルマブ	360mg	↑		↑
オキサリプラチン(L-OHP)	100mg/m ²	↑		↑
S-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与		7日間休薬

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m ² 未満	80 mg
1.25m ² 以上 1.5m ² 未満	100 mg
1.5m ² 以上	120 mg

【レジメン】

消化器科【胃癌】

ニボルマブ【day1】

対象症例 がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な進行・再発胃癌の3次治療以降

1サイクル 14日

薬剤	投与量	day1	day15
ニボルマブ	240mg	↑	↑