

## 【レジメン】

消化器科【食道癌】『DTX療法』

## ドセタキセル(DTX)【day1】

対象症例	転移性再発食道癌 2次治療		
1クール	21日		
薬剤	投与量	day1	day22
ドセタキセル(DTX)	70mg/m <sup>2</sup>	↑	↑

## 【レジメン】

消化器科【食道癌】『High dose FP療法 ①』

シスプラチン(CDDP)【day 1】 + 5-FU【day1~4】 ± 放射線治療

対象症例	食道扁平上皮癌 first line または再発食道扁平上皮癌 PS 0~2 で主要臓器機能に大きな異常がない						
1クール	4週間						
薬剤	投与量	Day	1	2	3	4	29
シスプラチン (CDDP)	70mg/m <sup>2</sup>		↑				↑
5-FU	700mg/m <sup>2</sup>		↑	↑	↑	↑	↑

## 【レジメン】

消化器科【食道癌】『High dose FP ②療法』

シスプラチン(CDDP)【day 1】 + 5-FU【day1~4】 ±放射線治療

対象症例	食道扁平上皮癌 first line または再発食道扁平上皮癌 PS 0~2 で主要臓器機能に大きな異常がない						
1クール	4週間						
薬剤	投与量	Day	1	2	3	4	29
シスプラチン (CDDP)	75mg/m <sup>2</sup>		↑				↑
5-FU	1000mg/m <sup>2</sup>		↑	↑	↑	↑	↑

## 【レジメン】

## 消化器科【食道癌】『High dose FP 療法』

## シスプラチン(CDDP)【day 1】 + 5-FU【day1~5】

## 対象症例

PS 0~2 で主要臓器機能に大きな異常がない 24時間CCrが50ml/min以上  
 a) 切除不能または再発食道扁平上皮癌  
 b) 食道扁平上皮癌術後補助療法(遠隔転移なし、組織学的にリンパ節転移を有する)

1クール 4週間

薬剤	投与量	Day	1	2	3	4	5	29
シスプラチン ( CDDP )	80mg/m <sup>2</sup>		↑					↑
5-FU	800mg/m <sup>2</sup>		↑	↑	↑	↑	↑	↑

## 【レジメン】

消化器科【食道癌】  
ニボルマブ【day1】

**対象症例** がん化学療法後に増悪した根治切除不能な進行・再発の食道癌  
※1次治療における有効性・安全性は確立していない  
手術の補助療法における有効性及び安全性は確立していない

**1サイクル** 14日

薬剤	投与量	
ニボルマブ	240mg	↓day1 ↑

## 【レジメン】

消化器科 【 食道癌 】

ペムブロリズマブ【day1】

対象症例 がん化学療法後に増悪したPD-L1陽性の根治切除不能な進行・再発の食道扁平上皮癌  
※PD-L1の発現(CPS $\geq$ 10)が確認された患者に投与すること

1サイクル 21日

薬剤	投与量	day1	day22
ペムブロリズマブ	200mg	↑	↑

## 【レジメン】

消化器科【食道癌】『ネダプラチン+5-FU』

ネダプラチン(CDGP)【day 1】 + 5-FU【day1~5】 + 放射線治療

対象症例	食道扁平上皮癌 first line または再発食道扁平上皮癌 PS 0~2 で主要臓器機能に大きな異常がない シスプラチン使用困難な患者							
1クール	4週間							
薬剤	投与量	Day	1	2	3	4	5	29
ネダプラチン (CDGP)	90mg/m <sup>2</sup>		↑					↑
5-FU	800mg/m <sup>2</sup>		↑	↑	↑	↑	↑	↑