

## 【 レジメン 】

消化器科【胆道癌】『CDDP+GEM療法』

シスプラチン(CDDP)【day1,8】+ ゲムシタビン(GEM)【day1,8】

対象症例	胆道癌 ※胆道癌での本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。				
禁忌例	高度な骨髄抑制のある患者 明らかな間質性肺炎または肺線維症を有する患者 胸部への放射線を合併している患者 重症感染症を合併している患者 腎機能障害を認める患者				
1クール	21日				
	薬剤	投与量	day1	day8	day22
	シスプラチン(CDDP)	25mg/m <sup>2</sup>	↑	↑	↑
	ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m <sup>2</sup>	↑	↑	↑

## 【レジメン】

消化器科【胆道癌】『GCS療法』

シスプラチン(CDDP)【day1】+ ゲムシタビン(GEM)【day1】+ TS-1【day1-7】

対象症例	胆道癌 ※胆道癌での本剤の術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない。		
1クール	14日		
薬剤	投与量	day1	day15
シスプラチン(CDDP)	25mg/m <sup>2</sup>	↑	↑
ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m <sup>2</sup>	↑	↑
TS-1	体表面積に応じて投与	7日間連日経口投与	7日間休薬

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m <sup>2</sup> 未満	80 mg
1.25m <sup>2</sup> 以上 1.5m <sup>2</sup> 未満	100 mg
1.5m <sup>2</sup> 以上	120 mg

## 【 レジメン 】

消化器科【胆道癌(胆嚢癌、肝外胆管癌、乳頭部癌)】『 GEM 療法 』

## ゲムシタビン(GEM)【day 1, 8, 15】

対象症例	切除不能・再発進行胆道癌症例の1st/2nd line a) PS 0~2					
1クール	4週間					
薬剤	投与量	day1	day8	day15	day22	day29
ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m <sup>2</sup>	↑	↑	↑		↑

## 【レジメン】

消化器科【胆道癌】『S-1+GEM療法』

TS-1(S-1)【day 1～day 14】 + ゲムシタビン(GEM)【day 1, 8】

対象症例 切除不能・再発胆道癌

1クール 3週間

薬剤	投与量	day1	day8	day15	day22
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与		7日間休薬	
ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m <sup>2</sup>	↑	↑		↑

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m <sup>2</sup> 未満	60 mg
1.25m <sup>2</sup> 以上 1.5m <sup>2</sup> 未満	80 mg
1.5m <sup>2</sup> 以上	100 mg