


消化器科【膵癌】『FOLFIRINOX療法』

オキサリプラチン(L-OHP) + イリノテカン(CPT-11) + レボホリナート(I-LV) + 5-FU



【 レジメン 】


消化器科【 膵臓癌 】『 GEM 療法 』

ゲムシタビン(GEM)【day 1, 8, 15】

対象症例	切除不能・再発膵臓癌及び術後補助化学療法症例の1st line				
1クール	4週間				
薬剤	投与量	day1	day8	day15	day22 day29
ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m ²	↑	↑	↑	↑

消化器科【膵癌】『mFOLFIRINOX療法』

オキサリプラチン(L-OHP) + イリノテカン(CPT-11) + レボホリナート(I-LV) + 5-FU



【 レジメン 】

消化器科【膵癌】『 nab-PTX + GEM 療法 』

アブラキサン(nab-PTX)【day1,8,15】+ ゲムシタビン(GEM)【day1,8,15】

対象症例	治癒切除不能な膵癌					
1クール	28日					
薬剤	投与量	day1	day8	day15	day22	day29
アブラキサン(nab-PTX)	125mg/m ²	↑	↑	↑		↑
ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m ²	↑	↑	↑		↑

【レジメン】

消化器科【膵臓癌】『NAC GS療法』

TS-1(S-1)【day 1～day 14】 + ゲムシタビン(GEM)【day 1, 8】

対象症例 術前化学療法

1クール 3週間

薬剤	投与量	day1	day8	day15	day22
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与		7日間休薬	
ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m ²	↑	↑		↑

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m ² 未満	80 mg
1.25m ² 以上 1.5m ² 未満	100 mg
1.5m ² 以上	120 mg

※TS-1投与量に注意
(対象症例によって投与量変更しています)

【レジメン】

消化器科【膵臓癌】『S-1+GEM療法』

TS-1(S-1)【day 1～day 14】 + ゲムシタビン(GEM)【day 1, 8】

対象症例 切除不能・再発膵癌

1クール 3週間

薬剤	投与量	day1	day8	day15	day22
TS-1	体表面積に応じて投与	14日間連日経口投与		7日間休薬	
ゲムシタビン(GEM)	1000mg/m ²	↑	↑		↑

【TS-1投与表(1日量)】 1日2回 朝・夕食後

体表面積	1日投与量
1.25m ² 未満	60 mg
1.25m ² 以上 1.5m ² 未満	80 mg
1.5m ² 以上	100 mg

※TS-1投与量に注意

(対象症例によって投与量変更しています)

消化器科【膵癌】『オニバイド+5-FU/I-LV療法』

オニバイド + レボホリナート(I-LV) + 5-FU

対象症例 がん化学療法後に増悪した治癒切除不能な膵癌
 ※1次治療・術後補助療法における有効性及び安全性は確立していない

1クール 2週間

